

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)¹

El BASDAI fue desarrollado para medir la actividad de la enfermedad en pacientes con espondilitis anquilosante.

Fecha: _____

Nombre de paciente: _____

Instrucciones

Por favor marque con una "X" el recuadro que representa su respuesta. Todas las preguntas se refieren a la última semana.

1. ¿Cómo describiría el grado global de fatiga /cansancio que ha experimentado

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ausente					muy intensa					

2. ¿Cómo describiría el grado global de dolor en cuello, espalda o caderas debido a su enfermedad?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ausente					muy intenso					

3. ¿Cómo describiría el grado global de dolor-hinchazón en otras articulaciones fuera de cuello, espalda o caderas?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ausente					muy intenso					

4. ¿Cómo describiría el grado global de malestar que ha tenido en zonas dolorosas al tacto o a la presión?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ausente					muy intenso					

5. ¿Cómo describiría el grado global de rigidez matutina que ha tenido al despertar?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ausente					muy intensa					

6. ¿Cuánto tiempo dura su rigidez matutina tras despertarse?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 horas			1 hora				2 horas o más			

Referencia: 1. R. Ariza-Ariza, B. Hernández-Cruz y F. Navarro-Sarabia. Rev Esp Reumatol 2004;31(6):372-8

AG2310189579 Fecha: 23/10/2023